

# Клиническая модель вероятности ИБС, взвешенная с учетом факторов риска

1

## Оценка симптомов (0-3 балла)

### Характеристика боли в груди

Тип и местоположение:

Сжимающий дискомфорт, локализованный за грудиной или в области шеи, челюсти, плеча или руки (1 балл)

Чем усугубляется:

Физическая и эмоциональная нагрузка (1 балл)

От чего испытывается облегчение:

Отдых или прием нитратов в течение 5 минут (1 балл)

### Характеристика одышки

Одышка и/или затрудненное дыхание, усиливающиеся при физической нагрузке (2 балла)

### Оценка симптомов

- Основной симптом:
- Боль в груди (0-3 балла) или
  - Одышка (2 балла)

2

## Количество факторов риска ИБС (0-5 баллов)

(Семейный анамнез, курение, дислипидемия, гипертоническая болезнь или диабет)

3


## Оценка клинической вероятности развития обструктивной ИБС, взвешенную по факторам риска (RF-CL)

### Оценка симптомов



KZ-PRL-36-2025-REV1-RU

# Возможные комбинации антиангинальных препаратов



KZ-PRL-36-2025-REM-RU

ИБС - ишемическая болезнь сердца, БКК - блокатор кальциевых каналов; ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких; ЗПА - заболевания периферических артерий, СНсФВ - сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса.  
\* СН (ивабрадин и бета-адреноблокаторы), фибрилляция предсердий (дилтиазем/верапамил и бета-адреноблокаторы), вазоспастическая стенокардия (дигидропиридин и нитраты)  
Christiaan Vrints et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal (2024) 00, 1–123